

PERSONNEL SOIGNANT

LES RISQUES DU MÉTIER

EXPOSITION AU SANG
OU A DES PRODUITS
BIOLOGIQUES

SALARIÉS

ASMT - 28/09/2016



Les personnes accidentées doivent ensuite pouvoir bénéficier d'un suivi adapté ⁽¹⁾

Déclarer l'accident de travail dans les 24 heures, et contacter le médecin du Travail pour analyser avec lui les circonstances de l'accident pour éviter qu'il ne se reproduise

Une recherche de statut sérologique du patient source avec son accord doit être possible en urgence

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre **service de santé au travail** ou retrouvez-nous sur www.asmt65.fr



Scannez pour rejoindre notre site internet

(1) en fonction du risque évalué afin de dépister une contamination (suivi sérologique) et de repérer d'éventuels effets secondaires en cas de traitement post-exposition (**arrêté du 10 juillet 2013**)

ASMT
Prévention et Santé

✉ contact@asmt65.fr **f** [asmt65](https://www.facebook.com/asmt65) **Q** www.asmt65.fr

☎ 05 62 93 81 81

Association de Santé et de Médecine au Travail des Hautes-Pyrénées

Conduite à tenir en cas d'accident

Définition

Un **accident exposant au sang** est défini comme **toute exposition percutanée** (par piqûre ou coupure), ou **tout contact sur une peau lésée**, ou **des muqueuses** (bouche - yeux), **d'un liquide biologique souillé par du sang**

4

Se référer à la procédure permettant de quitter l'établissement au cours du poste

Contactez le référent médical VIH au Service des Urgences du Centre Hospitalier de Bigorre dans les plus brefs délais

05.62.54.50.08

sachant que la prophylaxie VIH doit intervenir de façon optimale dans les 4 heures

SIDA Info Service 24 H / 24 H 0800-840-800
8h à 23 h tous les jours

3

Soins locaux immédiats

Ne pas faire saigner

Nettoyer immédiatement la plaie à l'eau courante et savon

Rincer

Antiseptique avec **DAKIN**, éventuellement eau de javel diluée au 1/10° ou à défaut avec tout autre antiseptique (iodé, alcool 70°, chlorexidine) en assurant un contact d'au moins 10 minutes

En cas de projection sur les muqueuses, en particulier au niveau de la conjonctive : rincer abondamment avec soluté physiologique ou à l'eau au moins 10 minutes

2

Si possible interrompre le soin ou acte en cours

1

Évaluer, si possible le risque infectieux sur le patient source, avec son accord.